UNIVERSITÉ DE STRASBOURG

TD1 - Détente de Joule-Gay Lussac

Jérôme Tribollet

Transcrit par
PIERRE GUICHARD

L3 Semestre 5 2020

Rappels de thermodynamique à l'équilibre

$$U = \langle E_{\text{tot}} \rangle = \langle E_{\text{pot}} \rangle + \langle E_{\text{cin}} \rangle$$

Premier principe :

$$\mathcal{C}_{I \rightarrow F} : \Delta U_{/\mathcal{C}_{I \rightarrow F}} = U_F - U_I = Q_{/\mathcal{C}_{I \rightarrow F}} + W_{/\mathcal{C}_{I \rightarrow F}} (+ \text{échange de matière})$$

Deuxième principe :

$$\Delta S_{/\mathcal{C}_{I \rightarrow F}} = \Delta S_{\text{échangé}/\mathcal{C}_{I \rightarrow F}} + \Delta S_{\text{créé}/\mathcal{C}_{I \rightarrow F}}$$

Dans le cas d'une transformation irréversible :

$$\Delta S_{\text{créé}/\mathcal{C}_{I \rightarrow F}} > 0$$

Dans le cas d'une transformation réversible :

$$\Delta S_{\text{créé}/\mathcal{C}_{I \rightarrow F}} = 0$$

En utilisant les lois de probabilités :

$$S(\{p_j\}) \equiv -k_B \sum_j p_j \ln p_j$$

U et S sont des fonctions d'état : ce qui veut dire que la variation ne dépend pas du chemin suivi :

$$\Delta U_{/\mathcal{C}_{\text{réelle } I \rightarrow F}} = \Delta U_{/\mathcal{C}'_{\text{virtuelle } I \rightarrow F}}$$

$$\Delta S_{/\mathcal{C}_{\text{réelle } I \rightarrow F}} = \Delta S_{/\mathcal{C}'_{\text{virtuelle } I \rightarrow F}}$$

Adiabatique : pas d'échange de chaleur avec l'extérieur

$$Q_{\mathcal{C}_{\text{réelle}}} = 0$$

Indéformable : Le travail sur la transformation réelle est nul

$$W_{\mathcal{C}_{\text{réelle}}} = 0$$

Gaz parfait : On néglige les interactions entre les particules

$$U_{\text{GP}} = \langle E_{\text{tot}} \rangle = \langle E_{\text{cin}} \rangle + 0$$

$$U_{\text{GP}_{\text{monoatomique}}} = \frac{3}{2} N k_B T$$

Équation d'état du gaz parfait :

$$PV = N k_B T$$

1 Approche thermodynamique

On considère un récipient composé de deux compartiments 1 et 2. Les parois sont adiabatiques et indéformables. Le compartiment 1 de volume V_1 est rempli d'un gaz parfait à température T_i (état initial i). Lorsque l'on ouvre le robinet, le gaz se répand dans le compartiment 2 de volume V_2 . La température finale du gaz est alors T_f .

1. Montrer que la transformation s'effectue à énergie interne U constante :

Le gaz est un gaz parfait

$$C_{I \rightarrow F} : \Delta U_{/C_{I \rightarrow F}} = U_F - U_I = Q_{/C_{I \rightarrow F}} + W_{/C_{I \rightarrow F}}$$

Puisqu'on est dans un système adiabatique et indéformable :

$$\Rightarrow \boxed{U_F = U_I}$$

2. Dédire la température finale du T_f après détente.

L'énergie interne U est constante, or l'énergie interne d'un gaz parfait

$$U_{GP} = \frac{3}{2} N k_B T$$

d'où on sait que

$$U_F = U_I$$

Alors,

$$\boxed{T_F = T_I}$$

3. Déterminer la variation d'entropie ΔS au cours de la transformation. On prendra $V_1 = V_2$

$$\begin{aligned}\Delta S_{/C_{I \rightarrow F}} &= \Delta S_{\text{échangé}/C_{I \rightarrow F}} + \Delta S_{\text{créé}/C_{I \rightarrow F}} \\ &= \int_I^F \frac{\delta Q_{\text{échangé}/C}}{T} + \Delta S_{\text{créé}/C_{I \rightarrow F}}\end{aligned}$$

Le problème sur cette transformation $\mathcal{C}$ c'est que $\Delta S_{\text{créé}/C_{I \rightarrow F}} > 0$

On va donc prendre une nouvelle transformation $\mathcal{C}'$ réversible, quasi-statique (succession d'états d'équilibre), ainsi on se retrouve avec :

$$\begin{aligned}\Delta S_{/C'_{I \rightarrow F}} &= \Delta S_{\text{échangé}/C'_{I \rightarrow F}} \\ &= \int_I^F \frac{\delta Q_{\text{échangé}/C'}}{T}\end{aligned}$$

On applique maintenant le premier principe infinitésimal à $\mathcal{C}'$:

$$\begin{aligned}dU_{C'} &= \delta Q_{C'} + \delta W_{C'} = 0 \\ \Rightarrow \delta Q_{C'} &= -\delta W_{C'}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta S_{/C'_{I \rightarrow F}} &= \int_I^F \frac{-\delta W_{/C'}}{T} \\ &= \int_I^F \frac{-(-PdV)}{T} \\ &= \int_I^F \frac{P}{T} dV\end{aligned}$$

D'après l'équation d'état des gaz parfaits, on sait que :

$$\frac{P}{T} = \frac{Nk_B}{V}$$

d'où :

$$\begin{aligned}\Delta S_{/C'_{I \rightarrow F}} &= Nk_B \int_I^F \frac{dV}{V} \\ &= Nk_B [\ln(V)]_{V_1}^{2V_1} \\ &= \boxed{Nk_B \ln(2) = \Delta S_{/C_{I \rightarrow F}}}\end{aligned}$$

4. Si le gaz n'est pas parfait, en général (l'hydrogène est une exception) la température baisse dans la transformation. Pourquoi ?

Par définition, U l'énergie interne,

$$U \equiv \langle E_{\text{tot}} \rangle = \langle E_{\text{cin}} \rangle + \langle E_{\text{pot}} \rangle$$

$$= \left\langle \sum_{j=1}^N \frac{\vec{p}_j^2}{2m} \right\rangle + \langle E_{\text{pot}} \rangle$$

$$U_{\text{gaz réel}} = \left(\frac{3}{2} N k_B T \right) + \langle E_{\text{pot}} \rangle$$

$$0 = \Delta U_{/c_{\text{réelle}}} = \frac{3}{2} N k_B \Delta T + \Delta \langle E_{\text{pot}} \rangle$$

d'où

$$\frac{3}{2} N k_B \Delta T = -\Delta \langle E_{\text{pot}} \rangle$$

$$-\Delta \langle E_{\text{pot}} \rangle > 0 \Rightarrow \Delta T < 0 \Rightarrow \boxed{T_F < T_I}$$

2 Approche statistique

On considère un gaz parfait formé de N molécules enfermées dans le compartiment 1 (état initial i). Ce système subit une détente de Joule-Gay Lussac (état final f). Les N molécules se répartissent aléatoirement dans les deux compartiments 1 et 2 de volumes identiques.

On peut donner de ce système une description grossière : des coordonnées de chaque molécule (en principe, trois coordonnées de position et trois coordonnées de vitesse), on ne retiendra que l'information suivante : soit la molécule est dans le compartiment 1, soit elle est dans le compartiment 2. On appelle une telle description un "système à deux états". Associée à cette description microscopique est la variable macroscopique n , le nombre de molécules dans le réservoir 1.

1. "Une molécule a la même probabilité de se retrouver dans le réservoir 1 ou dans le réservoir 2". Cet énoncé est-il un constant expérimental ou peut-il se démontrer ? Quelle est la valeur de cette probabilité ?

$$p + q = 1$$

$$p = q = \frac{1}{2}$$

C'est plutôt un constat expérimental (car il n'y a rien qui ferait que ça aille plutôt à gauche ou à droite (champ extérieur), évidemment dans un autre système on pourrait avoir une préférence).

Postulat d'équiprobabilité

Pour un système isolé d'énergie E fixée, à l'équilibre thermodynamique, tous les états microscopiques du système associés à cet état macroscopique sont équiprobables.

2. Faire un dessin des différentes configurations pour $N = 3$ et $n = 0, 1, 2, 3$ en indiquant les états macroscopique ainsi que les $\Omega(n)$ états microscopiques associés.

binôme de Newton :

$$(a + b)^N = \sum_{n=0}^N C_N^n a^n b^{N-n}$$

où

$$\binom{N}{k} = C_N^k = \frac{N!}{k!(N-k)!}$$

Correspond au nombre de combinaisons de n parmi N peu importe l'ordre du tirage.

$\Omega_N(n)$ c'est le nombre d'états microscopiques associés au même état macroscopique n .

Ainsi,

$$\boxed{\Omega_N(n) = C_N^n}$$

3. Déterminer le nombre total d'états microscopiques possibles du système, Ω_{tot} ?

Le choix entre deux possibilités (gauche ou droite) :

$$\underbrace{2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2}_{N \text{ fois}}$$

$$\Rightarrow \boxed{\Omega_{\text{tot}} = 2^N}$$

4. Donner le nombre de possibilités $\Omega(n)$ de trouver n particules dans le volume 1 (dégénérescence de l'état macroscopique n).

Nombre d'états microscopiques associés à ce même état macroscopique n .

$$\Omega_N(n) = \frac{A_N^n}{n!} = \frac{N!}{n!(N-n)!} = C_N^n$$

A_N^n tient compte de l'ordre du tirage et ici on ne tient pas compte du tirage.

5. Dédurre l'expression de $P(n)$ correspondant à la probabilité de trouver n particules dans le volume 1.

$$P_N(n) = C_N^n p^n q^{N-n} = \frac{\Omega_N(n)}{\Omega_{\text{tot}}}$$

Si on se met dans la situation d'équiprobabilité $p = q = \frac{1}{2}$:

$$P_N(n) = \frac{C_N^n}{2^N}$$

6. Pour étudier cette fonction, on préfère utiliser son logarithme $\ln P(n)$. Chercher l'extremum n_M de cette fonction (et donc de $P(n)$). De quel type d'extremum s'agit-il ? On rappelle que pour X suffisamment grand, on peut (on doit !) utiliser la formule de Stirling $\ln X! = X \ln X - X$

$$\begin{aligned} f_N(n) &= \ln(P(n)) \\ &= \ln(C_N^n p^n q^{N-n}) \\ &= \ln\left(\frac{N!}{n!(N-n)!} p^n q^{N-n}\right) \\ &\simeq \ln\left(\frac{N!}{n!(N-n)!}\right) + n \ln p + (N-n) \ln q \\ &= \ln(N!) - [\ln(n!) + \ln((N-n)!)] + n \ln p + (N-n) \ln q \\ &= N \ln N - n \ln n - (N-n) \ln(N-n) + n \ln p + (N-n) \ln q \end{aligned}$$

On sait que

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial n} &= 0 && \text{correspond à un extremum} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial n^2} &> 0 && \text{correspond à un minima} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial n^2} &< 0 && \text{correspond à un maximum} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial n} &= -\ln(n) + \ln(N - n) + \ln\left(\frac{p}{q}\right) \\ &= \boxed{\ln\left(\frac{N - n}{n}\right) + \ln\left(\frac{p}{q}\right)}\end{aligned}$$

On cherche $\partial f / \partial n = 0$

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial n} &= 0 \\ \ln\left(\frac{N - n}{n}\right) + \ln\left(\frac{p}{q}\right) &= 0 \\ \ln\left(\frac{N - n}{n}\right) &= \ln\left(\frac{q}{p}\right) \\ \frac{N - n_M}{n_M} &= \frac{q}{p} \\ N - n_M\left(1 + \frac{q}{p}\right) &= 0\end{aligned}$$

$$n_M = \boxed{\frac{N}{1 + \frac{q}{p}}}$$

On va calculer la dérivée seconde de f pour connaître son signe

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial n^2} &= -\frac{1}{n} - \frac{1}{N - n} \\ &= -\frac{1}{N - \frac{N}{2}} - \frac{1}{\frac{N}{2}} \\ &= -\frac{4}{N} < 0 \rightarrow \text{C'est un maximum}\end{aligned}$$

- 7. Effectuer un développement de Taylor au second ordre de $\ln P(n)$ autour de n_M . Déduire l'expression de $P(n)$ en fonction de N et n_M . Tracer la fonction $P(n)$.**

$$\begin{aligned}f(n) &\simeq \sum_0^{+\infty} \frac{\partial^{(n)} f}{\partial x^n} \Big|_{x_0} \frac{(x - x_0)^n}{n!} \\ &= f(n_M) + \frac{\partial f(n_M)}{\partial n} (n - n_M) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f(n_M)}{\partial n^2} (n - n_M)^2 + o(n - n_M)^2 \\ &= f(n_M) + 0 - \frac{2}{N} (n - n_M)^2 + o(n - n_M)^2 \\ \ln(P(n)) &= \ln(P(n_M)) - \frac{2}{N} (n - n_M)^2 + o(n - n_M)^2 \\ P(n) &\simeq \exp \left[\ln(P(n_M)) - \frac{2}{N} (n - n_M)^2 \right] \\ P(n) &= P(n_M) \exp \left[-\frac{2}{N} (n - n_M)^2 \right]\end{aligned}$$

Avec $n_m = \frac{N}{2}$.

$P(n)$ est une loi binomiale, c'est à dire une loi gaussienne au voisinage de l'extremum n_m ici.

Rappel : Gaussienne normalisée

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left[-\frac{(x - x_0)^2}{2\sigma^2} \right]$$

Alors,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) dx = 1$$

Et 2σ est la largeur totale à mi hauteur de la gaussienne.

8. Donner le rapport σ/n_M où σ représente la largeur à mi-hauteur de la fonction $P(n)$. Donner un ordre de grandeur de σ/n_M lorsque $N = 10^{23}$ molécules (environ une mole de gaz). Estimer de même les rapports de probabilités $P(N)/P(n_M)$ et $P(0)/P(n_M)$.

Donc ici,

$$\sigma^2 = \frac{N}{4} \rightarrow \boxed{\sigma = \frac{\sqrt{N}}{2}}$$

d'où

$$2\sigma = \sqrt{N}$$

$$\frac{\sigma}{n_m} = \frac{\sqrt{N}}{\frac{N}{2}} = \frac{2}{\sqrt{N}} \lim_{N \rightarrow +\infty} \rightarrow 0^+$$

Donc $P(n)$ est très piquée en n_m .

$$\frac{P(N)}{P(n_m)} = \exp \left[-\frac{4}{N} \frac{(N - n_m)^2}{2} \right] = \exp \left[-\frac{N}{2} \right] \rightarrow 0^+$$

de façon similaire :

$$\frac{P(0)}{P(n_m)} \rightarrow 0^+$$

L'état d'équilibre final est l'état macroscopique le plus probable au sens de la physique statistique.

9. À l'aide des résultats précédents, donner une description du système après la détente de Joule-Gay Lussac. les états $n = 0$ et $n = N$ sont ils interdits par la physique statistique ?

D'après les résultats précédent, ils ne sont pas interdits, mais fortement improbables.

10. L'entropie statistique pour un macroétat n est définie comme $k_B \ln \Omega(n)$. Calculer l'entropie du système pour dans l'état initial i et l'état final f (on ne prendra en compte que l'état macroscopique le plus probable n_M). Déduire la variation d'entropie ΔS lors de la transformation. Comparer à l'approche thermodynamique de la première partie.

Entropie en théorie de l'information (Shanon), mesure le "désordre", c'est à dire le manque d'information :

$$S(\{p_j\}) \equiv -k_B \sum_j p_j \ln(p_j)$$

Postulat d'équiprobabilité

Tous les états microscopiques d'un système isolé et à l'équilibre thermodynamique sont équiprobables.

Ici, pour l'état macroscopique " n ", il y a $\Omega(n)$ états microscopiques, qui sont tous équiprobables.

$$\sum_j^{\Omega(n)} p_j = 1 \Leftrightarrow \Omega(n)p_j = 1 \rightarrow p_j = \frac{1}{\Omega(n)}$$

ici

$$S_{\text{microcanonique}}^*(n) = -k_B \sum_{j=1}^{\Omega(n)} \frac{1}{\Omega(n)} \ln\left(\frac{1}{\Omega(n)}\right)$$

$$= \boxed{k_B \ln(\Omega(n))}$$

$$n_I = N \rightarrow n_F = n_m = \frac{N}{2}$$

$$\begin{aligned} \Delta S^*(n_F) &= S^*(n_F) - S^*(n_I) \\ &= k_B [\ln(n_F) - \ln(n_I)] \\ &= k_B \ln(C_N^{n_m}) \\ &= k_B \ln\left(\frac{N!}{\frac{N!}{2} \frac{N!}{2}}\right) \\ &= \boxed{N k_B \ln 2} \end{aligned}$$

On retrouve bien le même résultat qu'en thermodynamique.